MY LOV

LOVELY FEED

LA NOSTRA GAMMA

PREOVO 1	MANGIME COMPLETO PER POLLASTRE	PRIMA FASE PRE-DEPOSIZIONE	16 SETTIMANE
PREOVO 2	MANGIME COMPLETO PER POLLASTRE	SECONDA FASE PRE-DEPOSIZIONE	17 SETTIMANE
PRIMOVO	MANGIME COMPLETO PER GALLINE OVAIOLE	PRIMA FASE DEPOSIZIONE	18-35 SETTIMANE
SECONDOVO	MANGIME COMPLETO PER GALLINE OVAIOLE	SECONDA FASE DEPOSIZIONE	36-55 SETTIMANE
TERZOVO	MANGIME COMPLETO PER GALLINE OVAIOLE	TERZA FASE DEPOSIZIONE	>55 SETTIMANE

COME NASCE MY LOV

L'uovo è da sempre uno dei simboli più utilizzati per identificare i concetti di fertilità, semplicità, genuinità e soprattutto l'inizio del ciclo della vita!
È con queste prerogative che nasce la linea per galline ovaiole MY LOV! Una gamma di prodotti realizzati con amore seguendo meticolosamente i principi della tradizione mangimistica artigianale, attraverso l'utilizzo di materie prime semplici e genuine ma sopratutto nel pieno rispetto dei nostri valori aziendali: la passione, la trasparenza e l'umanità.

fusco
nutriamo la natura

Le immagini contenute in questo dépliant sono puramente a scopo illustrativo.

SECONDOVO

MANGIME COMPLETO PER GALLINE OVAIOLE

Mangime ideato per galline ovaiole che si trovano nella seconda fase di deposizione, tra le 36 e le 55 settimane di vita. Il supporto energetico e minerale a tale fase produttiva è garantito dalla composizione in materie prime e sali minerali, oltre all'opportuna integrazione in microelementi e amminoacidi.

COMPONENTI ANALITICI

IN % STQ

PROTEINA GREZZA	17,00 %
OLI E GRASSI GREZZI	4,60 %
FIBRA GREZZA	2,80 %
CENERI GREZZE	14,00 %
CALCIO	4,30 %
FOSFORO	0,75 %
SODIO	0,19 %
METIONINA	0,45 %
LISINA	0,96 %



PROFILO DI ACCRESCIMENTO

GLI INGREDIENTI

farina di granturco(**), farina di estrazione (di semi) di soia(*), carbonato di calcio [calcare], farinaccio di frumento, olio di soia(*), fosfato bicalcico [idrogenoortofosfato di calcio], melasso di canna (da zucchero), sodio cloruro, sodio bicarbonato.

ADDITIVI PER KG

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite	
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	10.000,000 UI
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	3.200,000 UI
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	50,000 mg
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	1,500 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,030 mg
3a825i Vitamina B2 (Riboflavina)	5,000 mg
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	3,000 mg
3a315 Niacinamide	50,000 mg
3a880 Biotina	0,150 mg
3a710 Vitamina K3 (menadione bisolfito di sodio)	3,000 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	10,000 mg
3a890 Cloruro di colina	400,000 mg
3a316 Acido folico	1,500 mg
Composti di oligoelementi	
3b103 Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato)	25,000 mg
3b502 Manganese (Ossido di manganese II)	100,000 mg
3b405 Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato)	6,000 mg
3b603 Zinco (Ossido di zinco)	90,000 mg
3b203 Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti)	1,200 mg
3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti)	0,250 mg
Aminoacidi, loro sali e analoghi	
3.2.3 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	551,600 mg
3c305 L-metionina	1.773,000 mg
Leganti	
E 562 Sepiolite	250,000 mg
Coloranti	
2a161g Cantaxantina	5,800 mg

ISTRUZIONI D'USO

Particolarmente indicato per le galline ovaiole nel secondo periodo di produzione, dalla 36° alla 55° settimana.

PROFILO GRANULOMETRICO

	< 1 mm	1-2 mm	2-3 mm	> 3 mm
SECONDOVO	10-15%	20-25%	35-50%	20-25%



AVVERTENZE

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2., 3a890 - Evitare l'uso simultaneo con acqua da bere addizionata con cloruro di colina- Si raccomanda di non eccedere i livelli supplementari di 1.000 mg di cloruro di colina/kg di mangime completo per pollame., 3b405 - Vietato l'uso nell'acqua di abbeveraggio.

NOTE

**Da granturco geneticamente modificato
*Da soia geneticamente modificata



D.L.N. 17 DEL 16 FEB 2012 | RICONOSCIMENTO N° a IT-000051-CE